

# Транспортування лактуючих (дійних) корів

## ✓ Транспортування лактуючих (дійних) корів

**Лактуючі (дійні) корови** є вразливими тваринами і потребують **особливої обережності** при транспортуванні. Корови, яких не доять регулярно, **можуть зазнавати сильного болю** через збільшення тиску у вимені та підвищений ризик розвитку маститу або інших захворювань. Спеціальний догляд та належні практики транспортування можуть цьому запобігти.



**Якщо корова більше не може встати (корова, що лежить), негайно викличте ветеринарного лікаря!**

## Підготовка до перевезення лактуючих (дійних) корів

1

Пам'ятайте – протягом **першого тижня після отелення транспортування заборонене**

2

Якщо лактуючих (дійних) корів не супроводжують їхні телята, їх необхідно доїти **щонайменше кожні 12 годин**

3

У разі планування транспортування лактуючих (дійних) корів для довготривалих рейсів слід переконатися в наявності доїльного обладнання на контрольному(их) посту(ах)

5

**Краща практика! Забезпечте воду та корм** під час доїння та переконайтеся, що корови можуть їсти/пити перед повторним завантаженням для продовження транспортування

4

Завжди **спокійно розвантажуйте** корів до доїльного залу контрольного посту

**Для лактуючих (дійних) корів оптимальна температура — від 5°C до 15°C.** Нижче 5°C коровам потрібне додаткове тепло — особливо при протягах та високій вологості. **Не транспортувати при температурі понад 30°C.**